



**駆除する
方法！**

●手作業で根っこから抜き取りや草焼きなど地道な作業を続ける必要があります。
根から引き抜く→2～3日天日にさらして枯死させる→ビニール袋に入れて処分
(拡げないようにするために、種子をつける前に駆除することが望めます。)

⚠ 似たような花に気をつけてください！！



キバナコスモス
(花期：5月～7月)



キバナコスモスの葉
・小さく細かく分かれ、切れ込みが深くコスモスに似ている。



オオキンケイギクの葉
・鳥の羽根のように枝分かれする形で丸い。
・両面に粗い毛がある。

アレチウリ

アレチウリ

北アメリカ原産の生育速度が非常に速いつる性植物

長さ

数～数十メートル

花期

8～10月

特徴

・果実に鋭いいばらを密生する。



環境省で、駆除すべき『特定外来生物』に指定されており栽培・運搬・販売・野外に放つことが禁止されています！



**駆除する
方法！**

●手作業で根っこから抜き取りや草焼きなど地道な作業を続ける必要があります。

Point

- ①種をつける前に！
- ②小さいうちに！
- ③1年に数回は！
- ④現れなくなるまで！

◆効果的な駆除時期

1回目：6月中旬

2回目：7月下旬～

8月上旬

3回目：9月上旬

※特定外来生物とは……もともとその地域に生息していなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物

□お問い合わせ 役場 2階 産業課 農地係 ☎ 43-2111 (内線 2257) まで